

observation

un jeune garçon âgé environ de seize à dix-sept ans se bati avec un de ses compagnons qui lui frappa la teste contre la muraille. il ne se sentit pas blessé et continua d'aller en classe a son ordinaire au bout de onze a douze jours sa mere se tant apperçue qu'il portoit souvent la main a la teste. J'avisai de regarder et ayant reconnu qu'il y avoit une enclote beaucoup plus molle me fit appeller sur le champ, ie trouvais a la partie moyenne lateral externe du parietal une portion de la calotte charnue. longue de cinq travers de doigts et large environ de quatre. au toucher mollette. que de la partie tres delicate ou il paroissoit avoir une fluctuation tres soubde ie plongeais mon bistouri droit jusque dans le corps des muscles et il n'en sortoit rien, ie approfondis jusque au crane que ie sentis valisser contre l'instrument, sur le champ il sortit crane et il sortit sur le champ quatre ou cinq cuillerées d'un sang noir, et plus fluide que le sang naturel. ie vacuais tout ce sang et i'ay rapproché <sup>les bords</sup> la plaie. Le lendemain i'ay trouvé tout le caillot recollé au crane il a esté guéri en moins de vingt quatre heures. J'oublie de dire qu'après l'incision j'introduisis ma sonde dans tout le progres de la plaie que i'ay trouvée au crane par toute dentree du perioste. et cette épanchemment paroissoit visiblement estre fixée entre le crane et le perioste.

AR 50 n° 43



par la description de cette plaie et cette expérience que j'ai fait pour la première fois je crois qu'on doit réunir toutes ces plaies ou incisions qu'on a fait pour donner issue au sang extravasé. et qu'on ne doit jamais les amener à suppuration lorsque le sang ne pas putresce et qu'il ne peut avoir communiqué aucune altération avec la putrescence ou putrefaction. au contraire dans le cas d'une épanchement de sang putresce et qui croûte sur le crâne on ne peut se dispenser de tenir la plaie dilatée et de l'amener à suppuration et pour l'ordinaire il se fait exfoliation de la portion du crâne qui a esté altérée. le panchement de matiere ou de sang qui est entre le périoste et le crâne ne peut pas former ce me semble. tumeur avec circonscription comme cette observation m'a procuré l'occasion de remarquer parce que le périoste et la calotte charnue est trop tendue et trop épaisse et que le sang ou autre matiere trouve moins de resistance à s'étendre. au large (en détachant les adhérences du périoste d'avec le crâne) qu'à pousser en dehors pour former une tumeur ou tumeur circonscrite.

j'ai fait encore depuis la même observation à la différence que le panchement étoit considérablement plus petit mais il a croûte sur le crâne sept ou huit jours.

### Observation

un homme âgé environ de trente<sup>2</sup> cinq à quarante ans reçut un coup de quille à la partie moyenne latérale externe du coronal du côté

3  
droit il ne tomba pas d'un coup accablé mon dit les  
deux chirurgiens qui ont parlé aux personnes qui  
estoyent témoins. Son adversaire se sauva après lui  
avoir donné le coup et le blessé courus après lui  
jusque a la maison de l'autre ou il s'estoit sauvé  
il le defia de sortir par des menaces et des empor-  
tement on ramena celui cy chez lui et il but avec  
ses camarades encore pendant deux bonnes heures  
enfin pres de quator heures après avoir recus le  
coup il fut se coucher il est bon de dire qu'il estoit  
pris de boisson le lendemain matin a dix ou onze  
heures sa femme voyant qu'il ne se reveilloit point  
l'appella a haute voix et le tira rudement par la  
main voyant que c'estoit en vain elle fit appeler  
un chirurgien qui ayant fait tout son possible pour  
leveiller dit qu'on devoit aller chercher un medecin  
et qu'il estoit tombé en apoplexie cependant il le  
pensa d'une petite playe non penetrante et superficielle  
a la partie cy dessus marquée le medecin estant  
arrivé le fit saigner et ordonna une potion ou mel-  
ange enfin il est mort le lendemain la trois ou  
quatre heures après minuit sans avoir repris con-  
noissance la justice y envoya trois chirurgiens  
et un medecin pour voir si on ne pourroit pas re-  
connoître la cause de la mort de cette homme  
Les chirurgiens se contentèrent d'examiner l'endroit  
de la playe ou avoit porté le coup de quille avec la  
circonférence seulement et ayant reconnu la playe  
superficielle et sans fracture ils ont fait leur rapport  
qu'ils n'avoient reconnu aucune cause de mort



4  
occasionné par le coup. le chirurgien iuré de la  
ville qui estoit le plus anciens attribua la cause  
de sa mort à une appoplexie causée par l'excès  
de boisson qu'il venoit de faire dans la b et par le portement  
et la colere qu'il s'estoit abandonné et son sentiment  
ne fut pas combattu ni par les autres chirurgiens  
ni par le medecin. cependant quatre ou cinq  
heures apres les magistrats apres s'estre consulté  
ne parurent pas content de ce rapport ils renvoyerent  
le chirurgien et le medecin pour reexaminer de  
nouveau et un des ieunes chirurgiens fit une grande  
incision cruciale (avant que l'ancien chirurgien  
iuré fut arrive) et ils ~~decouvrirent~~<sup>apperceurent</sup> une fente qui  
se terminoit dans a cette partie. il agrandirent  
l'incision cruciale iusque a la partie opposée et  
tout a fait inferieure et ils decouvrirent une fracture  
ou fente qui prenoit depuis la partie moyenne anterie  
ure et un peu laterale externe du parietal du  
cote oppose (a la playe ou a porte le coup) et qui se  
terminoit par la partie superieure a la suture sagittale  
dans l'endroit qu'il fouche la suture coronal cette  
fracture en montant sur le parietal cottojoit la  
suture coronal de deuse lignes et dans d'autre endroit  
de trois, quatre cinq et six lignes et comme i'ay  
examinee apres la mort la fracture avec beaucoup  
d'attention elle avoit la figure d'un ~~u~~  ~~conforme~~  
d'attention elle avoit cette figure icy  ~~le~~  
le centre de la fracture estoit comme le  
milieu de cette figure. les deux branches  
de cette meme ~~fracture~~ figure l'une montoit iusque  
a la suture sagittale comme il est decrit icy  
dessus la branche inferieur de la fracture  
descendoit

5 Desceudoit jusque ala partie inferieur da coronal on a enlevé  
le crane et on a trouvé epanchement de sang sur  
la dure mere qui estoit considerable

## Observation



3  
Mr plubeau medecin a Namur homme  
tres digne de foi madit questant chirurgien  
maior dans le regiment de colin  
lamber au service des estats de hollandes.  
il avoit pensé un dragon du meme regi  
ment qui recut un coup de sabre ala partie  
moyenne laterale externe et presque infe  
rieur du parietal en dedolant qui avoit em  
porté une portion de cette os et une portion  
de la partie ecailleuse delos squammeuse  
mais qui ne formoient qu'une seul piece.  
laquelle restoit attachee a une portion de la  
calotte charnue qui estoit encor adherente  
la dure mere estoit restee decouverte de la  
largeur d'un liard il madit qu'il avoit fait  
ce lambeau qui tombois sur le col et qu'il  
l'avoit appliqué le plus exactement qu'il  
lui avoit esté possible dans sa situation  
naturelle et qu'il la maintenus dans cette  
estoit que cette playe avoit gueris tres prompt  
ement sans suppuration layant pense avec le  
seul beume dont j'ay oublié mais il n'importe  
quel beume comme je crois.

Le meme auteur ma dit ~~plusieurs fois~~ en conversation qu'il avoit eut en plusieurs fois des semblables cas dans l'avant dernière guerre entre autre il ma dit qu'un soldat agant recus un coup de fusil chargé abale vers les dernières ~~apophyses~~ & vertebres du dos ou les premières des lombes avec des portions des ces memes vertebres emportées la moelle de l'épine estoit restée toute à decouvert, la partie ~~an~~ postérieure ou externe, et les ~~deux~~ parties laterales en sorte qu'il étoit presque ~~gâté~~ il la pensa, cette moelle spinal avec quelque beaume jusque a ce que la regeneration des chairs l'eut recouvert et il a gueris parfaitement sans accident. il ma dit qu'il avoit eut une homme entre les mains qui recut un coup iaj oublié de quel instrument qui lui avoit separé le nez depuis la portion ou commence le cartilage qui forment les ailes du nez jusque au deus<sup>e</sup> os du nez qui en forment la voûte osclusive<sup>ment</sup> et cette ~~por~~ portion estoit tombée sur la levre inferieure. de la bouche, il faut remarquer a ce qu'il ma dit que la levre inferieure estoit aussi coupée parallelement avec le nez et cela au moins jusque a moitié: il a replacé cette portion du nez le plus juste qu'il a put et il a introduit dedes tentes de linges dans les deux narines qui penetrent assez avant dans les il y a appliqué pour les maintenir dans cette estat des boîdes d'une emplatre agglutinatif il se servit d'un beaume et d'un bandage contentif ou unissant il a parfaitement gueris sans cicatrice difforme.

7

J'ai eut entre les mains paré une homme  
qui <sup>est</sup> ~~est~~ la jambe brisée d'un coup de pied de  
cheval a la partie presque supérieure et  
il avoit déjà esté quatre mois et demi entre  
les mains d'un chirurgien qui demeure a huit  
lieu de namur au bout duquel tems on me  
l'amenna et nous fimes une consultation  
de quatre chirurgiens apres l'avoir examinée  
ils ont opiné pour l'amputation disant qu'après  
quatre mois et demi deors n'estant nullement  
soudé dans une homme de son age il n'y avoit  
point d'esperance de guerison (c'est esté avant  
mon dernier voyage de paris) j'ai sondé deux  
& plaies l'une étoit a parties antérieures et un  
peu latérale externe. l'autre étoit a la partie  
latérale interne et parallèle a la première la  
sonde alloit ~~de~~ côté c'est à dire de la partie  
antérieure jusque a la partie postérieure de  
la partie latérale interne jusque a la partie  
latérale externe il sortoit de ces deux ulce  
res fistuleux et carcinomax une prodigieuse  
quantité de matiere, j'ai dilaté un peu l'une  
et l'autre ulcere fait d'un côté fait et de  
l'autre. ie decouvris par le moyen de ces incisions  
on les deux extrémités du tibia qui étoit cassé  
on ligne oblique avec fragment il en sortis  
sage ou dix sept piéces dans l'espace de quatre  
ou six mois et meme six mois <sup>et plus</sup> qu'il avoit  
entre mes mains



8 n'ayant pas put détourner ces matières  
qui dégorgeoient à la partie antérieure des  
deux ulcères et qui baignoit les deux  
estremités de l'os cassé et la seule cause peut  
estre qui a empêché le calus de se former  
d'ailleurs on ne pouvoit donner à cette jambe  
aucune situation favorable pour maintenir  
les os réduits ~~car j'ay pris la résolution~~ ie me  
determinais (les autres tentatifs ayant esté  
sans succès) à passer un seton de la partie  
antérieure à la partie postérieure mais un peu  
latéral externe pour la commodité des personnes  
ce que ie executais par le moyen d'une sonde creuse  
que j'introduisis et que ie sentis répondre à la  
partie postérieure au travers de l'épaisseur des tegu-  
ments (à cette sonde il y avoit une ouverture pour  
passer le seton) le seton passé ie le laissais trois  
ou quatre jours crochant par ce moyen empêcher  
les matières de baigner sur les os et leur faire  
prendre la route du seton mais les matières  
continuoient toujours à dégorger en grande quantité  
par en haut ie dilatais et agrandis l'incision à la  
partie postérieure de la jambe ie poussais mon doigt  
entre les muscles jumeaux, cette dilatation fut sans  
succès ie crus alors que la membrane interosseuse  
pouvoient servir de planche à ces matières qui  
les arretoient cette manœuvre dura plus de  
quatre mois mais ayant examiné de nouveau

2. La jambe ~~se voy~~ estoit aubout de huit  
mois ~~et~~ <sup>un</sup> mois et demy ou environ) j'ay trouve  
quel estoit non plus avancee que le premie-  
rou quel fut mise entre mes mains. ioublic de  
de dire que j'avois passe une sonde sous le  
fibia depuis <sup>la partie</sup> lateral interne ou estoit l'ulcere  
iisque a la partie opposee ie voulus pratiquer  
par une incision une pente a leur ecoulement  
cette incision estoit tiree depuis la partie poster-  
ieure du fibia a l'endroit de la fracture iisque a  
la partie lateral interne dans la meme ligne  
observant que l'incision fut decouvert un plan  
plus incline. Tout cela ne fit rien, ie me resolut  
de couper transversalement depuis l'ulcere qui estoit  
a la partie un peu anterieure de la jambe. que j'avois  
seulement de ci a l'autre en long et en travers  
ie coupais donc tous les muscles entraver qui se trou-  
voient dans lespace que ie devois pour couvrir pour  
gagner la partie presque posterieure de la jambe  
et cela afin de ne faire que de ne laisser qu'une seule  
route a la matiere, de servir de maître du fond  
de la plaie et d'obliger la matiere a se decharger  
par en bas, ie fis la meme chose du cote lateral  
interne de la jambe. les matieres en fin sortir  
de bien plus bas que les os, ils changerent de  
couleur et de consistance, les chairs ~~reg~~ <sup>reg</sup> se  
regenerent, le cal commença a se former et a  
acquis peu a peu de solidite enfin a la fin du  
dixieme mois la jambe se soulevoit sans se  
plier a la fracture comme elle faisoit peu



10 auparavant elle a esté entièrement guérie  
sur la fin du onzième mois et fort difficile  
est adire autant que l'autre. il restoit seulement  
des enfoncements considérables à la cicatrice à  
cause des portions des qui sont sorties.  
observation

j'ai esté appelé. pour voir une femme qui  
avait un sein monstrueux par sa grosseur  
enorme. il avait deux pieds et demi et quelque  
pouces de circonférence dans son milieu et  
à son extrémité du côté du mamelon il avait  
pres de deux pied et demi à sa base. ou il est  
attaché aux muscles pectoraux il avait trois  
pieds de circonférence depuis le mamelon jusqu'  
à la poitrine dans la partie supérieure jusqu'à la  
poitrine il avait plus d'un pied de longueur et la  
partie postérieure autant. il étoit d'une terrible  
pesanteur quand on le soutenoit sur la main il  
étoit d'une grande pesanteur se soulevoit qu'il  
avait de leau se frappoit quelque coup avec le  
doigt en appliquant la main à plat du côté opposé  
on ne sentoit aucun mouvement d'ondulation il n'étoit  
pas extrêmement dur ny tendu dans toute la  
superficie cependant quand on appuioit un peu  
fort une dureté qui résistoit. la peau n'étoit  
nullement changée de couleur elle a esté fort long  
temps entre les mains des chirurgiens et le dernier  
quel la sucoit aujourdhuy entre les mains lui a  
ouvert trois petites fumeurs (à plusieurs fois)  
qui s'étoient élevées successivement sur la superficie  
et il n'en sortis que de leau j'ai soulevé après

apres avoir bien examine le sein quil estoit  
 squarreux interieurement ce qui avoit occasion  
 dhidropisie par la pression de ce corps estrange  
 contre les vaisseaux et en refaisoit le retour du  
 sang par les veines lesquelles se distendant de plus  
 en plus donne lieu ala serosite de ~~se~~ <sup>se</sup> transuder  
 au travers des tuniques. et former opaclement  
 ce pourquoy je dis au chirurgien qui traitoit ~~ce~~  
 cette femme dy porter un coup de trois quars il ne vult  
 pas disant quil avoit senti un corps dur resister  
 ala pointe de son instrument cependant trois ou  
 quatre iours apres <sup>il sortit</sup> par une des pincisions que  
 le chirurgien avoit fait sept ou huit iours apres  
 avant quatre pintes deau mesure de paris laque  
 estoit tres bonne a cause que si jy devoit sejourner  
 peu est trop long temps. Ce sein ne demoura  
 guere de grosseur et il res estoit verte aussi dure  
 quau paravant trois ou quatre iours apres il devint  
 aussi dur quil estoit, avant la sortie des eaux  
 il sortit des champignons ou songes par cette  
 ouverture qui devint aussi gros quune forme  
 de chapeau et qui croit faillir les costes cause  
 ayant este evacuee se schier se schirer plus  
 trouva obstacle a son accroissement et extension



12. j'ay toujours estimé que dans les playes  
recentes la ~~reunion~~ reunion par les moyen  
de la suture seche au bord estoit preferable  
a celle des equilles a moins que dans un cas de  
playe profonde par laquelle la suture seche  
n'auroit plus lieu.

j'ay <sup>peu</sup> le mois passé un jeune garçon de sept  
a huit ans qui eust la cuisse déchirée en  
travers d'un coup de dent d'un cochon cette playe  
prenoit depuis a un pouce de la partie inferieur  
de la commissure des levres elle avoit trois doigt  
d'étendue avec des tendons decouverts il lais réunis  
avec des bords d'une emplâtre agglutinatif  
le beaume du commandeur et le bandage unissant  
le lendemain j'ay humecté un peu le plumaceau  
seulement et il vis la playe bien réunie au bout  
de quatre ou cinq jours j'ay defait mes bords  
il puis dire que j'en ai jamais eut une si belle  
reunion a peine voyoit on la cicatrice. L'enfant  
ne se pas plaindre au seul moment pendant la cure  
il puis dire avoir esté charmé de cette petite cure  
par cette methode les levres de la playe  
ne sont point sujettes a se tumefier par  
ce que les petits rameaux des vaisseaux se  
trouvent comme es triangle par la ligature.  
ce qui occasionne quelque fois une petite  
inflammation et il arrive meme souvent une  
petite suppuration les trous des equilles  
autres quel causent bien de la douleur versent  
encore bien du temps pour se detacher et le  
cicatriser ce qui n'arrive pas par cette methode  
methode j'ay desus

reflexion

13

jay traité des inflammations qui occupent  
sont presque tout un membre, comme  
le bras, ou la jambe, cependant par les  
notions que nous donne la pathologie de ces  
maladies cette inflammation n'est qu'une  
erysipelle, et point phlegmon cependant  
le sentiment commun est qu'il faut que cette  
erysipelle devienne phlegmon pour s'abceder  
jay remarqué plusieurs fois que cela n'estoit  
pas toujours vrai au moins à la superficie de  
la partie extérieure de la partie affectée, par  
ou nous tirons les signes et les différences  
des degrés de ces maladies, la rougeur n'estoit  
pas d'un rouge foncé et lorsqu'on pressoit  
legèrement avec le doigt le sang s'échappoit  
à la circonférence sur le champ et la marque  
vestoit blanche insque au retour du sang  
qui revenoit très promptement, et c'est la  
preuve de la mobilité du sang qui circule  
encore dans cette partie, cette disposition  
du sang fait la différence de l'erysipelle  
au phlegmon qui ne blanchit point quand  
on presse sur la partie au moins légèrement  
comme jay remarqué bien des fois, mais  
ce que je crois qui arrive à ces erysipelles  
qui s'abcedent avant d'arriver à l'état de  
phlegmon ce que celui ci est plus profond  
comme sous les teguments tandis que  
la surface extérieure de la partie ne



ne montre qu'une erysipelle - quand l'abcès est formé après un phlegmon assez profond la matière ne forme pas une tumeur circonscrite. au contraire il n'y en a pas du tout au moins de sensible. L'endroit où le lieu que la matière occupe ne parois pas plus élevé que la circonférence comme par exemple. lorsque la matière est placée sur les muscles elle s'étend bien plus facilement au large qu'à faire tumeur parce que la résistance est trop grande de la part de tout les teguments. Le dernier que j'ai traité depuis peu avoit au moins trois quarts de pied de tendue et pres de six doigt de large en quelque endroit et comme cette matière se étoit formée très promptement et qu'elle n'étoit pas corrompue je me contentois au lieu de faire des grandes incisions je me contentois d'en faire une suffisante pour donner une libre sortie aux matières observant de faire l'incision dans le centre de l'abcès et à la partie la plus déclive donnant une situation favorable à la pente des matières vers l'ouverture et quand il y a une grande abondance des matières, je le évacuois trois fois le jour au bout de trois ou quatre jours les matières devenoient plus blanches et perdoient leur sanguinolence.

Les deux grands vide qui restent au  
 deux coté de la playe. ie les rapproche  
 par le moyen des compresse et du bandage  
 incarnatif cette methode m'a reussie souhait  
 et lorsque les chairs de la playe estoient  
 regenees iusque a quelque lignes des bords  
 exterieur ie me fero des bords pour les  
 rapprocher ce qui abege beaucoup la guerison  
 ie peu dire avoir reussi par ce moyen  
 comme il est ci dessus deuit au grand estonne  
 ment de quels uns de mes confreres. ie pense  
 que lorsque la matiere ne point corrompue  
 quel na point des mauvaises qualite elle ne  
 sauroit alterer les parties ou elle est enfermee  
 par ce qui se fait promptement. on ne  
 sent point de fluctuation a ces absces  
 ou du moins elle est si obscur q'on ne  
 sauroit dire quil y ena lorsque vous  
 appuiez legereement les doigt sur la partie  
 vous sente q la cavite quel est plus mole  
 eshaillure elle repone au doigt tout come  
 sil y avoit du vide par dessous la peau  
 i'ay senti de ces absces d'ou il sortoit dam  
 le commencement pres d'une dem chopine  
 de matiere et le troisieme ou le quatrieme  
 jour les vaisseaux qui avoient este compr  
 me reprennent leur mouvement et ie croi  
 que se dans ce temps la q'on doit comme  
 ncer a rapprocher le vide.



Les vaisseaux ayant repris leur ressort-  
 ils se déchargent des matières étrangères  
 qu'ils contenoient par les endroits où il y  
 a rupture de vaisseaux. Les matières  
 abordoient long temps et même creuseroient  
 toujours un plus grand vider si par le  
 rapprochement du vider et la compression  
 légère on ne fermoit par ce moyen les emb-  
 ouchemens des vaisseaux rombus il est vrai  
 qu'on pouvoit se rendre maître de ces  
 matières par une incision qui ouvreroit  
 l'abcès presque d'un bout à l'autre mais  
 comme j'ai vu de ces abcès avoir plus  
 d'un demi pied d'étendue il faudroit une  
 grande incision la cuve seroit beaucoup  
 plus longue et plus douloureuse,  
 j'ai vu <sup>une</sup> de ces abcès qui avoient sans  
 escagerer au moins un pied de longueur  
 de ce pays je voulais même y faire une  
 contre ouverture et comme c'étoit à la  
 fin le bout de ma sonde se perdoit dans les  
 muscles fessie et on ne sentoit point  
 la sonde répondre à l'exterieur il y avoit  
 un vider pour pouvoir y loger deux point  
 il feroit plus d'une chopine et demi de matière  
 à chaque pressement ce qui adonné frais quatre  
 jours j'ai rapproché ce grand vider en  
 trois fois et j'ai esté le plus surpris de  
 monder de voir une abcès enorme guérie

1<sup>er</sup> en sept ou huit iours.

## Observation

M<sup>r</sup> Bernard ancien chirurgien à

Amur a traité une tumeur énorme  
située depuis la partie latérale externe du  
côté gauche et un peu postérieur <sup>de la gorge</sup> inscrite sur  
sa partie antérieure et moyenne <sup>de la gorge</sup>  
elleomboit d'un côté sur l'épaule et antérieurement  
sur la poitrine. elle étoit indolente elle  
vacilloit le chirurgien crut appercevoir une  
fluctuation <sup>la</sup> ~~de~~ <sup>la</sup> pointe de la tumeur étoit  
adivie a sa partie inférieure, comme on  
voit qu'il arrive aux chairs laches et fongueuses  
il fit une incision assez longue il en sortit qu  
du sang, il se servit des remèdes consommeurs  
il a consommé toute la tumeur et il la par fait  
ent guérie et véritablement ie crois que ces  
tumeurs qui ressemblent à des loques par leur  
vacillation et <sup>consistance</sup> sont toutes fait insensibles  
peuvent ~~être~~ <sup>être</sup> guérie par ce moyen. il y  
avoit bien des années que cette homme portoit  
cette tumeur et le chirurgien mal adroit qui  
ne pouvoit jamais ouvert fil n'est pas crus y  
trouver de la matiere. Les chairs fongueuses  
laches et indolentes se peuvent accéger me  
semble traiter par les caustiques sans jamais  
rien craindre meme avec promptitude elle ne sont  
point susceptibles d'inflammation et on fait des grands  
progrès en peu de temps au contraire d'autres car



exocinematiques qui ne peuvent souffrir  
les caustiques. Sans irriten terriblement ce qui  
peut les faire degenerer en cancer. comme  
l'experience nous la deia fait voir.

observation

une homme passant dans la rue fut  
frappé d'une botte de foin de vingt cinq  
livres qui lui tomba sur la teste. de trois estages  
et demi de hauteur il avoit un pied levé pour  
marcher l'autre jambe dont le pied posé par  
terre. ressentit la commotion du coup dans le genou  
dont il eut beaucoup de peine a retourner chez lui  
il resta trois semaines sans pouvoir sortir  
apparemment par la vibration du coup qui se transmit  
de la teste a l'épine de celle ci aux os du bassin  
a la cuisse ensuite au genou qui estoit a demi fléchi.

observation

une femme agée de soixante et dix sept ans  
portoit depuis vingt ans ou environ une descente  
de matrice qui faisois jusque a la partie moyenne  
de ses cuisses de la grosseur de la teste d'un adulte  
homme adulte. elle estoit assez dure d'une couleur  
d'un rouge assez terne, et ulcerée dans plusieurs  
endroits cette femme estoit d'un tres bon temperament.  
son chirurgien la fit mettre au lit et apres plus  
ieurs jours d'usage d'une fomentation emolliente et  
un peu resolutif, et apres que les ulcres furent  
gueries il fit la reduction de cette matrice et se

Je servis ensuite d'une fomentation résolutive  
et arimée qu'il injecta même dans la matrice  
après lequel temps il lui mis un pessaire quel  
quout. Tout les iours elle ne s'appareoit plus  
de rien du tout ne se sentant plus nullement  
incommodee. et il ne passe plus rien du tout  
au dehors

### Observation

on m'amena a Namur une fille d'une  
lieu de cette ville âgée de treize a quatorze  
ans elle avoit une tumeur qui prenoit de  
puis la partie inferieur de l'os coronal de  
la face externe de deux sinus frontaux qui  
se terminoit en une pointe moufle a peu pres comme  
un pain de sucre. et qui descendoit plus bas que  
son menton ses yeux estoient forme a peu de chose  
pres mais ~~entierement~~ et presque entièrement cachés  
par la tumeur. le nez entièrement effacé et  
compris dans la tumeur la bouche entièrement  
cachée et pour la voir il falloit soulever la tumeur  
c'estoit comme un montre. le curé de la paroisse  
avoit defendu avec parents de cette fille de la  
laisser sortir pas même pour aller a la messe les  
iours de dimanches. les parents me sollicitèrent  
vivement de puis quelque temps pour voir si je  
ne pouvois pas oter au moins une partie de cette  
defformité. apres bien des instances je fut curieux  
~~il est bon de dire~~ oublié de dire que cette tumeur  
avoit la grosseur et la figure d'une petite de cochon.

120 petite teste. de cochon dont la partie la  
plus large de la teste. prenoit au front comme  
il est decris cy dessus, et la plus estroite. descer  
doit sur le menton toute. cette masse estoit ~~un~~  
un peu convexe <sup>a</sup> dans sa partie superieure ou anterieur  
elle estoit assis indolente. par toute la peau n'estoit  
pas changee excepte a la pointe. quelle estoit  
d'un rouge un peu terne. on sentoit dans la circon  
ference de la base de cette tumeur aussi bien que  
de la partie moyenne que des inegalitez et duretes  
~~et~~ la pointe de cette tumeur estoit tellement molle  
qu'on aurois cru qu'il y avoit fluctuation  
m'en de fois cependant Monsieur d'armagnac qui  
a este. garçon chirurgien plusieurs années  
Monsieur merand estoit dans ce temps la avec  
le ponce de montcauban (a qui il est chirurgien)  
a namur ie lui fit voir cette petite fille et  
après l'avoir examiné avec attention il me dit  
qu'il estoit croquis. qu'il y leust un fluide venferme  
ie lui repondis que ie doutois. cependant  
jeust la curiosité de ~~faire~~ <sup>faire</sup> faire une  
petite incision le lendemain il en sortis beaucoup  
beaucoup de sang qui sortoit comme ven l'avant  
j'introduisis mon doigt a l'entree ie sentoie des  
chaüres d'une grande laçité que ie deslavois  
sans aucune peine avec mon doigt et qui  
sembloient se fondre ou se convertir en sang  
cela me faisoit plaisir de voir de la tumeur

~~à voir~~

22 a été considérablement diminuée par la  
doute de ces choses cette diminution subite  
me permit d'y introduire mon doigt bien avant  
pour examiner l'état des os du nez mais je n'en  
sentis aucune vestige. Je crus qu'ils estoient  
fondus, ou carifiés la malade ne sentoit point  
ou très peu de douleur en par la manœuvre  
de mon doigt je remplis cette cavité que je  
faisais légèrement pour arrêter le sang.  
Le lendemain je j'y retourne par ce que  
je me transportais dans la maison à la campagne  
je trouvais la circonférence de cette plaie  
c'est à dire les bords fort tumescents durs et  
très douloureux ce qui me parut de noter  
un caractère de cancer, enfin le surlendemain  
les chairs estoient beaucoup augmentées  
avec des petites monticules ou bourgeons très  
durs séparés les uns des autres très durs  
et très douloureux il en couloit une saignée  
d'une odeur assez forte très fétide enfin ce  
cancer augmenta si prodigieusement qu'elle  
mourut en quinze jours de temps ses parents  
me dirent que deux jours avant mourir et  
particulièrement la veille et le jour qu'elle est  
morte il a sorti plus de deux pots d'eau ou  
humeur sanieuse qui a parse son lit et mouillé  
toute la paille.



23

~~MM~~ ~~MM~~  
 réflexion

Dans les tumeurs humorales assés froides  
 et lentes de leur nature soit par la faiblesse  
 des solides ou la crudité des matières,  
 cependant la suppuration devoit être avantageuse  
 pour terminer la maladie, je suppose le cas  
 et on ne peut avancer la suppuration au de-  
 hors elle reste long temps à se manifester.  
 savoir si l'application des ventouses à la partie  
 affectée ne pouvoit point l'accélérer <sup>un</sup> parce que  
 la ventouse diminue la résistance ou la pression  
 de l'atmosphère sur la partie.  
 réflexion

comme nous avons déjà vu de ces exemples  
 de voluvelles dans les gros intestins comme  
 le colon et le rectum. et ces malades ayant  
 supposé pris le mercure cru lequel n'ayant  
 point passé parce que ce voluvelle étoit de  
 haut en bas comme on la déjà vu après  
 l'ouverture de ces cadavres. savoir si trois  
 onces ou environ de mercure <sup>cru</sup> ne suffisoient pas  
 pour descendre ou remplacer cette portion de la  
 tunique nerveuse qui est déplacée de bas en  
 haut et si le mercure ne descend pas par laues  
 alors comme on ne sait pas dans quel region  
 est fixée ce voluvelle, ni la nature de son  
 espèce savoir si on ne pouvoit pas donner le  
 mercure en lavement pour l'espèce de maladie.

24. contraire a celle pour laquelle on l'ordonne  
par la bouche. Si l'on trouve un volumineux  
dans le rectum ou dans le colon de cette nature  
il peut le guérir tout de même a peu près que  
le mucus pris par la bouche. Quelques cas qui  
sont d'une disposition contraire a ceux-ci. il  
faut donner au malade une situation qui est la  
pour la descente du mucus, ie <sup>peut</sup> ~~avoir~~ même quel  
pouvoir plus facilement ~~se~~ forcer la valvule  
du cecum qu'en se forçant. ~~du vent~~ laire qu'on  
il se forcé entre.

J'attends le détail et les circonstances d'une  
observation qui est arrivée a charleville.  
une homme étant a la chasse s'arrêta comme  
pour se reposer en tenant l'embouchure du canon  
de son fusil dans sa bouche en appuyant son  
côté le palais, comme cela se voit quelque fois  
le fusil a lâché les balles son entrée par le  
palais et sortit a ce qu'on assure par la par  
ties supérieures du crâne. si cela <sup>est</sup> comme on  
l'assure et que l'academie n'en ait pas encore  
reçu un mémoire j'aurais l'honneur de vous  
l'envoyer.



25 Messieurs

Messieurs les illustres acca-  
demiciens. De l'academie royale de  
chirurgie de paris.

Messieurs ce pour la troisieme  
fois que j'ay l'honneur de vous presen-  
ter quelques petits memoires et  
observations ils sont tres fidelement  
raporte tel que ie les ais remarque  
de mes propres yeux, et d'autres que  
j'ay appris par des gens de lart tres  
digne de foy ie vous prie de ne prendre  
garde qu'a mon zele pour m'instruire  
et point du tout a la maniere dont ie

vous les expose. vous avez déiaunt  
 en moi des preuves extraordinaires  
 de mon zele pour ma profession, oui  
 Messieurs le croiriez vous que j'ai fait  
 quitter a nature tout intérêt toute  
 autre considération a cede d'honneur  
 de partir dicy toute esproes pour vous  
 aller presenter a l'academie les premieres  
 d'un foible essai de chirurgie au vestre  
 Messieurs il y a toujours a coup seur  
 quelque chose d'excellent que j'ai recueilli  
 des sçavantes remonstrations de Mesmes  
 et qui avoient directement rapport au suiet  
 qui est traité dans ce petit ouvrage.



mais Messieurs le motif le plus  
 pressant qui me determine a l'entreprendre  
 a este principalement l'expressément  
 de vous aller rendre un des premiers  
 une homage et un tribut qui vous est  
 dus esperant par ce zele me distinguer  
 le plus entre les estrangers de cette contree  
 aupres de l'academie et mériter

par ce moyen l'honneur de votre  
 protection, j'attends donc Messieurs  
 votre jugement sur le liore que j'ai  
 put l'honneur de vous presenter ie ne  
 vous saurois iamaïs exprimer  
 combien ie desir ardemment de tenir  
 en quelque chose a votre illustre acadé-  
 mie ie ne peut le mériter que <sup>par</sup> mon  
 zele, qui ne cede a aucun que ce puisse  
 estre n'hésite pas ie vous supplie  
 d'écouter favorablement une aspirant  
 qui n'a pour vous presenter que ce zele,  
 en partage il n'y a personne dans toute  
 la chirurgie du monde qui ait plus  
 besoin de cette honneur et de votre protec-  
 tion ne fus ce qu'en qualité d'expectant  
 alors j'usais ie attendre cinquante ans pour  
 mériter d'estre en place, n'importe ce  
 foudroy beaucoup d'honneur de la part  
 de l'academie ie ne peut vous dissimuler  
 Messieurs que ie vois avec douleur

28 Des bacheliers de la faculté de Louvain  
qui non glorieux car ou deux tout au plus  
d'anatomie occuper la place de démonstrateur, ou  
professeur en anatomie à brusselle et  
cela parce qu'il y a peu de chirurgien  
instruits dans l'anatomie iay fait l'avant  
age de la pratiquer pres de six ans  
à l'hotel dieu et quatre autres années  
dans l'école de St come et les autres écoles  
publics si i'avois eut messieurs le plus  
moyen titre de la part de l'academie  
iestois pour l'estre préféré au bachelier  
mes tentatif aiant esté inutile à  
brusselle ie suis revenu à clàmier  
ou nous sommes dans la même occurrence  
avec les medecins pour l'anatomie  
heureusement qu'il n'y a personne entre eux  
qui la sachent iay mais elle sçait ie  
crains encor un autre jeune bachelier  
de Louvain vous pourrè elle sçait  
par une grace, une honneur, un titre,  
ou la plus petite qualité de votre part




29 Determiner nos magistrats en ma  
faveur il n'y a presque pas de chirurgien  
dans le pays pas qui soit anatomiste ainsi  
Messieurs il depend de vous de nous donner  
cette avantage fouts les chirurgiens de ce  
~~par pays~~ ne tarderons pas a s'appuyer  
de l'interet que vous prenez a la chirurgie  
dans nostre pays


Messieurs


J'ai l'honneur d'estre avec un  
profond respect, beaucoup d'attachement  
et de zele


vostre tres humble et  
tres obeissant serviteur  
Jaudacq


a Namur ce 28 fevrier 1736











Vn jeune garçon